

RoACTEMRA

Injektion

MINA INJEKTIONSSTÄLLEN


Använd denna guide för att hålla koll på var du har injicerat RoACTEMRA. Du bör använda olika områden varje gång du ger dig själv en injektion, minst 3 centimeter från din senaste injektion. Bilden här bredvid visar vilka ställen på kroppen du bör välja.

Rekommenderade injektionsställen är framsidan och mitten av låren samt nedre delen av buken minst 5 centimeter nedanför naveln. Injicera inte i områden som kan irriteras av ett bälte eller resår. Injicera inte i födelsemärken, ärr, blåmärken eller i områden där huden är öm, röd, hård eller skadad.

Om en vårdgivare ger injektionen kan ytterdelen av överarmen också användas.



DATUM FÖR
INJEKTION



☐ = HÖGER ÖVERARMS YTTERSIDA

☐ = VÄNSTERS ÖVERARMS YTTERSIDA

 = INJEKTIONSSTÄLLEN

SE/RAC/09/18/0014

RoACTEMRA® ACTPen®

MINA INJEKTIONSSTÄLLEN


Använd denna guide för att hålla koll på var du har injicerat RoACTEMRA. Du bör använda olika områden varje gång du ger dig själv en injektion, minst 3 centimeter från din senaste injektion. Bilden här bredvid visar vilka ställen på kroppen du bör välja.

Rekommenderade injektionsställen är framsidan och mitten av låren samt buken minst 5 centimeter från naveln. Injicera inte i områden som kan irriteras av ett bälte eller resår. Injicera inte i födelsemärken, ärr, blåmärken eller i områden där huden är öm, röd, hård eller skadad.

Om en vårdgivare ger injektionen kan ytterdelen av överarmen också användas.



DATUM FÖR INJEKTION



☐ = HÖGER ÖVERARMS YTTERSIDA

☐ = VÄNSTERS ÖVERARMS YTTERSIDA

 = INJEKTIONSSTÄLLEN

SE/RAC/09/18/0014